

LA PIOMETRA

DEFINICIÓN

Se trata de una infección uterina en la que los gérmenes responsables son transportados generalmente por vía natural.

Ciertas situaciones favorecen el desarrollo de la metritis:
 inmunodeficiencia (diabetes mellitus), administración repetida de progestágenos o corticosteroides, un embarazo, manipulación obstétrica durante el parto.

Si el cuello uterino está abierto, el pus drenará continuamente; en cambio, si está cerrado, el resultado será una acumulación de pus (piometra).

SÍNTOMAS

- Secreción vulvar purulenta, a veces teñida de sangre, que el propietario puede confundir con diarrea, a menudo 2 meses después de entrar en celo.
- Hipertermia variable
- Poliuro-polidipsia
- Anorexia
- Vómitos
- -Palpación de útero dilatado
- Dolor abdominal

OTRAS PRUEBAS

Ecografía: dilatación uterina, derrame peritoneal (peritonitis, rotura uterina).

Radiografía de abdomen: imagen de densidad de líquido con aspecto tubular en la región caudal.

Análisis de sangre: leucocitosis, aumento de urea y creatinina (insuficiencia renal secundaria).

TRATAMIENTOS

Cirugía:

En caso de infección grave, cuando el tratamiento médico es ineficaz y la hembra no está destinada a la reproducción se recurre a una OVH.

Tratamiento médico :

-Antibióticos: Amoxicilina 10-20 mg/Kg 2 veces al día IV, IM, PO o Cefalexina 10-15 mg/kg 2-3 veces al día IV, IM, PO

- Prostaglandinas: PGF_{2a} 100-150µg/kg 2 veces al día SC (favorece el vaciado del útero).

○ Aglepristona, fluidoterapia y tratamiento de la insuficiencia renal

COMPLICACIONES

- Insuficiencia renal
- Septicemia
- Peritonitis por rotura uterina